

中国动物疫病预防控制中心 （农业农村部屠宰技术中心）文件

疫控防〔2021〕54号

中国动物疫病预防控制中心关于印发 《雨季养殖场户非洲猪瘟防控技术指南》的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市动物疫病预防控制机构，新疆生产建设兵团动物疫病预防控制机构：

当前，临近雨季，各地降雨量陆续增加，非洲猪瘟防控压力加大。为做好非洲猪瘟防控，稳定生猪生产，我中心组织全国动物防疫专家委员会猪病组专家编写了《雨季养殖场户非洲猪瘟防控技术指南》，现印发给你们，请参照执行。

附件：雨季养殖场户非洲猪瘟防控技术指南



附件

雨季养殖场户非洲猪瘟防控技术指南

雨季来临，猪场处于高湿环境，猪只抵抗力下降。非洲猪瘟病毒更易存活，消毒效果大幅度降低，非洲猪瘟病毒传播风险增高，防控难度加大。养殖场户应采取针对性措施，提升防控力度。

一、做好防雨排涝准备

1. 在猪场外可挖隔离防疫沟，保证场内积水及时排出；适当加高场外挡水设施，防止猪场外环境雨水流入场内。
2. 提前检查和疏通场内排水系统，清理杂物，必要时加深、加宽排水沟。
3. 在场内地势低洼区域放置挡水板和沙袋，或做好引流，防止积水。
4. 检查场内门窗是否完好，特别注意饲料仓库门窗及料罐密封性。
5. 硬化猪场内和销售区等高风险区域地面。
6. 制定停电、停水、洪涝等应急预案。
7. 密切关注天气预报，提前启动应急措施。
8. 对于存在洪水威胁的猪场，做好防水墙，可准备应急转移猪只的空场。

二、防止饮水污染

1. 猪场宜使用深井水和自来水，避免使用地表水和浅井水。
2. 避免使用建在低洼处的水井，加高井口高度并加盖，关注井内套管是否严紧，采取防倒灌措施，防止雨水倒灌，污染井水。
3. 增加猪只饮水消毒措施。

三、强化卫生消毒

1. 雨天消毒可加大消毒药使用浓度。
2. 可在消毒池或消毒盆上搭建遮雨棚，保证有效的消毒浓度。
3. 雨后及时对场外相关环境和道路进行消毒，对场内环境和道路进行排水、清扫和消毒。
4. 可适当增加消毒频次。
5. 所有进入猪场的车辆，必须经过清洗、消毒和烘干，确保车辆表面温度达 60℃，烘干 30 分钟以上。

四、强化猪群防疫

1. 猪场应增加对周边环境样本的非洲猪瘟病毒监测频率，同时加强猪群的临床巡查，及时发现和淘汰异常猪只，快速排除疫情隐患。一旦发现疫情，立即按程序报告，并尽早采取隔离、清除、消毒等措施，防止疫情扩散。
2. 根据猪场疫病流行特点，做好猪瘟、猪伪狂犬病、猪口蹄疫等病毒性疫病的疫苗免疫和猪链球菌病、副猪嗜血杆菌病等细菌性疫病的防治。

3. 及时进行免疫抗体水平监测,确保达到群体免疫效果,及时淘汰不健康猪只,提升猪群免疫力和健康水平。

五、强化饲养管理

1. 科学设置饲养密度,保持猪舍内适宜的温度、湿度、通风和光照,提高猪群舒适度,减少猪只应激反应。

2. 加强对饲料储存场所的日常巡查,确保饲料新鲜无霉变,必要时可使用放置生石灰等方法降低仓库湿度或减少饲料存量。

3. 检查水线、用电设备等是否正常。

六、强化生物安全措施

1. 雨季降低人员和物品的流动频率,尽量不出场、不进场,减少与外界车辆、人员、物品接触,降低病毒传入猪场的风险。

2. 减少雨天场区内的生产操作,避免人员串舍和用具交叉,尽量不出售猪只,也不引种,特殊需要时需对运输车辆进行适当密封。

3. 雨后应喷洒杀虫剂,防止蚊蝇滋生。

4. 加大养殖场外围巡查,对雨水腐蚀和损坏的墙体及时修复,防止鼠类进入。

5. 雨后做好人员和猪只通道地面的清理和消毒,检查栏舍、仓库等地面是否有渗漏情况,及时进行处理。

七、强化无害化处理

及时对病死猪及其排泄物以及受污染的垫料、包装物等进行

无害化处理，防止雨水冲刷导致病原微生物扩散和传播。雨季不宜采用深埋方式掩埋病死猪。

抄送:农业农村部畜牧兽医局

中国动物疫病预防控制中心(农业农村部屠宰技术中心)办公室
2021年4月19日印发
